

3月~5月の管理ポイント

平成12年3月3日
(株)トモグリーン・ケミカル

3/5(日) 啓 蟄 (冬ごもりの虫が這い出る日)

コーライは、中・下旬より萌芽が始まります。…メカエース・グリーンメカ・メカプラス
(砂が上がったバンカー周りより青味を増して来ます。)



害虫

シバオサゾウムシ成虫
スジキリヨトウ(越冬幼虫)

ダイボスチオン乳剤

FW・ラフ散布の場合 <1000 l タンク>

ダイボスチオン 500ml × 3本 (1.5 l) 660 倍液

アクアグローL 1 l ~ 2 l 加用 500ml / m² 散布

コーライグリーン コアリング作業(この期間内に)

ダイアジノン SL ゾル 3~4ml / 1 l / m²

芝の活動がはじまる

3月

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

4月

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

5月

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ベント コアリング(この期間内に)
ダイアジノン SL ゾル 3~4ml / 1 l / m²

ウスチャコガネ成虫発生

シバオサゾウムシ越冬成虫発生

病害

<ベント>

ダラスポットの予防、治療 … ロブドー水和剤

× 500 倍 1 l / m² 散布

<コーライ>

ヘルミントスポリウム葉枯病(犬の足跡)

… ロブドー水和剤 × 500 倍 1 l / m² 散布

糞塚形成防止剤 **みみんず水和剤(500g × 20 袋)**

1L / m² 散布の場合は 500 倍液にして散布下さい。

アクアグローL × 1000 倍又は

ダイボスチオン 2000 倍加用はより有効です。

(注)洋芝へのご使用は避けて下さい。

泡消し剤 **BBS**

サッチへのヌレを良くするので
発芽前土壌処理剤に加用
をおすすめします。

コアリング作業後

プライマー604

2ml / m² 毎月 1 回散布

ドライスポット

<注意>

農薬、肥料との混合散布の場合は
1 l / m² でご使用下さい。

アクアダクト

2.5ml / m² 1 l 散布

ドライスポット発生時

<注意>

散布直後又は夕方必ず散水、
実施は回復を早めます。2~3 日
続けて手散水下さい。

安全性

芝生の根に対して世界で
唯一安全性の高い界面
活性剤です。