

スティンガー®

フロアブル

250ml×4本

新規格になって新登場!

【適用害虫および使用方法】

作物名	適用害虫名	㎡当りの使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルベンジアミドを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
芝	スジキリヨトウ	0.035ml	50～200ml	発生初期	2回以内	散布	2回以内
	シバツトガ タマナヤガ	0.05ml	50～500ml				

新規格のメリットと改めてお伝えしたいスティンガーフロアブルの良さ!

その1

チョウ目防除に対する高い実績!

スティンガーフロアブルは発売開始から早 12 年、多くのお客様にご愛顧いただき、ご満足のお声を多く頂戴しております。

耐雨性に優れ、長期残効によりシバツトガやタマナヤガ、スジキリヨトウの発生を抑えます。



シバツトガ

その2

大面積でも使いやすい新規格!

旧規格より大容量になったことで、約 20,000～28,000 ㎡/ケースまで散布できるようになりました!

フェアウェイやラフに発生するスジキリヨトウにも高い効果を示します。卵塊を見つけたら、是非お試しください。



スジキリヨトウ

その3

摂食剤・・・だからこそ効く!

スティンガーはチョウ目害虫が葉を食し、口から取り込むことによって効果を発揮します。また、残効性が長い殺虫剤です。だからこそ! 警戒心が強く日中は土に潜りっぱなしである夜行性のタマナヤガにも効果を発揮することができます!



タマナヤガ



フェアウェイやラフに発生するスジキリヨトウの散布適期はいつ？




フェアウェイやラフでどれくらいの残効性があるの？降雨の影響は？

平面ラフ散布におけるスジキリヨトウへの実残効確認試験

ノシバの平面ラフにステインガーフロアブル (0.035ml/m²・0.05ml/m²) を散布！
 ゴルフ場から散布 36、64、106 日後にポットサイズの芝を掘り取り、室内飼育したスジキリヨトウ若～中齢幼虫を放虫し、実際の残効性がどれだけ続いていたかを調べました！
 散布日：2016 年 7 月 27 日
 調査日：2016 年 8 月 31 日 (散布 36 日後)
 9 月 29 日 (散布 64 日後)
 11 月 9 日 (散布 106 日後)
 ステインガーフロアブルは約 2 ヶ月残効性が確認できました！
 その間、降った雨の量は 503.5mm！
 85.5mm/日も降った日もあり、降雨があっても残効を維持しました。



(自社試験)



取扱店:

販売元: 株式会社 二チノ一緑化

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 14-4
 岡谷ビルディング 6 階
 TEL: 03-3808-2281 FAX: 03-3808-2360

株式会社 トモグリーンケミカル

〒420-0816 静岡県葵区沓谷 5 丁目 9-12
 TEL: 054-264-2151 FAX: 054-264-2153