

# 8・9月の推進品目と管理ポイント

平成 12 年 7 月 31 日  
(株)トモグリーン・ケミカル

- ・今年例年より梅雨明けも早く、残暑の厳しい日が続くと予想されます。
- ・ベントではドライスポットの発生を受けます。
- ・病害ではピシウム菌(赤焼け)、害虫ではシバツトガ、スジキリヨトウ、コガネ幼虫の被害が発生しやすく一年の中でもっとも注意が必要なシーズンです。

## ベント

### ドライスポット

<予防> プライマー-604 2ml/m<sup>2</sup>

発生してしまった場合

<治療> アクアダクト 2.5ml/m<sup>2</sup>

\* 散布後又は夕方十分な灌水を実施下さい。

## コーライ

・散水過多は葉枯病(犬の足跡)を誘発します。

### ロブドー水和剤

キャッチドー水和剤 2g/m<sup>2</sup>

## 栄養剤

### グリーンメカ・メカプラス・メカエース

・呼吸量が激しいため糖の消費が多く補給が必要です。

・秋の立上りをスムーズにします。

・アミノ酸補給に

...マリンパワー 2~4ml/m<sup>2</sup>

## 害虫

エキソジノン・・・シバツトガ

ダイボスチオン・・・スジキリヨトウ

1000倍 0.3~1㎡/m<sup>2</sup> 散布

ダイアジノンSLゾル・・・コガネ幼虫

250倍 1㎡/m<sup>2</sup> 散布

## 悪臭除去(マスキング)

・レスメルくん・・・除草剤(ジェイサン)  
殺虫剤(ダイアジノン・スミチオン・カルホス)

1000㎡に50~100ml

・レスメルくんPART2

2,4-D・MCPP・ザイトロンのホルモン剤専用

## 活水剤

### アクアグローシリーズ(粒剤)

・芝張り箇所、ティグランドにはサイクロン・散粒器で撒け、水を有効利用出来ます。

## 雑草(スズメノカタビラ)

ジェイサン乳剤 1.5~2ml/m<sup>2</sup>

8月上旬に1回処理が重要

## マメ知識

### <セマダラコガネ成虫>

日本全国のゴルフ場に発生が見られ、重要害虫の一つです。

体長 8.0~13.5mm

触角は9節からなり、先端3節(片状部)は前方に伸長し、オスでは著しく長い。

オス



メス

