



<10月> 比較的日照量も多く、表面が乾きやすいので灌水が必要となります。

ベントはマット化すると、病害等のトラブルを起こしやすく回復に時間がかかります。

<11月> N過多は霜害を受けやすい。

ベント **ダラスポット(葉枯れ)** ロブドー水和剤 2g/m² ・キャッチドー水和剤 2g/m² 1ℓ散布

栄養剤 **グリーンメカ、メカプラス、メカエース** 5ml/m² 1ℓ散布

アミノ酸補給にマリンパワー 2~4ml/m² 1ℓ散布

雪腐れ病 <11月> **オキシンドー80水和剤** 2g/m² 250~1ℓ散布

固着剤(TSS、ラビコート*) 加用はより効果的です。(*印はソグリー扱い商品です。)

コーライ **ヘルミントスポリウム葉枯れ病(犬の足跡)** ロブドー水和剤 500倍 1ℓ/m²散布

疑似葉腐病(春ハゲ) **グリーンオキシラン** 500倍 1ℓ/m²散布

赤さび病 **イオウフロアブル** 300倍 0.3~0.5ℓ/m²散布

糖の補給 **グリーンメカ、メカエース** 200倍 1ℓ散布



害虫 **スジキリヨトウ** 幼虫の活動は晩秋まで続き被害を出します。特に夕陽の当るラフ法面、ティーは注意が必要です。

シバオサゾウムシ成虫、幼虫 10月上旬~11月上旬に注意。

ダイボスチオン 1000~1500倍 ・ **エキソジノン** 1000倍 0.5ℓ/m²以上

* シバオサゾウムシ幼虫には**アクアグローL** を加用




除草剤 **FW、ラフのスズメノカタビラ防除** **ジェイサン** 2ml/m²+**アージラン** 0.25g/m²

* 重複散布防止にカラーマーカー加用が便利です。

コーティング剤(蒸散抑制剤) 「**リーフシールド**」(米国製) 200倍液 150~200ml/m² 散布

着色剤に加用することにより霜融けや着色剤がみずみずしく染め上がります。


洋芝種子 **ベレニアルライグラス(VIP ・ラレド)** **ケンタッキーブルーグラス(ビバ・ノウム)**



スーパーソフト

芝張作業

暗渠排水



10~30g/m²

スーパーソフト.G

花壇



展示会のご案内
 関西(万博記念公園)
 10/18(水)19(木)
 九州(佐賀競馬場)
 11/17(金)
 尚、関東(幕張メッセ)の
 展示会は本年開催され
 ません。