

第56号

# 4~5月ご推進品目と管理ポイント

4月中旬迄は寒暖の差が激しく、花冷えの日もあります。特にコーライはN肥を控え、糖・キレート鉄の施用をお進めします。桜前線の上昇と共に気温も上がり4月中下旬にはコガネムシ成虫の飛翔も見られます。又、4月下旬~5月は日射も強く乾燥するのでマメな灌水が必要です。

## ペント

ドライスポットの発生... (予防) ブライマー604 2ml/m<sup>2</sup> (発生後) アクアダクト\* 2.5ml/m<sup>2</sup>

\*散布直後又は夕方迄に灌水して下さい。3日間は手散水の実施が回復を早めます。

(病気)

- ・ヘルミントスパリウム葉枯病
- ・ダラースポット
- ・テイクオールパッチ、イエローパッチ

(予防)

キャッチドー水和剤  
グリンオキシラン水和剤

2g/m<sup>2</sup> 水量 0.5~1ℓ/m<sup>2</sup> 敷布

(予防と治療)

ロブドー水和剤 2g/m<sup>2</sup> 水量 "

## コーライ

しづみ症... ブライマー604 + メカエース 5ml/m<sup>2</sup> 2回実施下さい(10~14日間隔)

\*乾燥させないようマメな灌水が重要です。

(予防・治療) ロブドー水和剤 2g/m<sup>2</sup> 水量 0.5~1ℓ/m<sup>2</sup> 敷布

(病気) ・葉枯病(犬の足跡)

(予防) グリンオキシラン水和剤 2g/m<sup>2</sup>

(予防・治療) ロブドー水和剤 2g/m<sup>2</sup> ] 水量 0.5~1ℓ/m<sup>2</sup> 敷布

## 害虫

4月中旬 ~ ヒラタアオコガネ成虫  
シバオサゾウムシ成虫 ] ...ダイボスチオン乳剤 1,500倍 水量 250~300ml/m<sup>2</sup> 敷布

4月下旬 ~ ウスチャコガネ成虫 1,000倍 水量 "

4月上旬 ~ 5月 コガネムシ幼虫 ... ダイアジノンSLゾル 3~4ml/m<sup>2</sup> 水量 1ℓ/m<sup>2</sup>

## 雑草

メヒシバ ... ジェイサン乳剤 2ml/m<sup>2</sup> 水量 200~300ml

\*アージラン80 0.25g又はホルモン剤加用はより効果的です。

FW・ラフの除草剤散布の際は、エキソジノン乳剤・ダイボスチオン乳剤を加用し越冬害虫の同時予防を。

## 栄養剤


糖の補給とアミノ酸の補給

・グリーンメカ ] 5~10ml/m<sup>2</sup> 水量 1ℓ/m<sup>2</sup>  
・メカプラス ] 2~4ml/m<sup>2</sup> 水量 "

## マーカー剤

カラーマーカー

(袋のまま投げ込める包装)  
重複散布防止に役立ちます。



日本導入  
7周年  
[ プライマー604  
プラナナキャンペーン  
ご好評 実施中!!  
1ヶ月が過ぎました 期間 H13.3~8末

新発売  
コロエンザ  
増健機能性資材 包装 2kg × 10袋  
(技術資料進呈) (10,000m<sup>2</sup>分)