

# 8~9月の推進品目と管理ポイント

平成13年7月31日  
株式会社 トモグリーンケミカル

ホームページアドレス  
<http://www.tomo-green.com/>

## ベント



猛暑、残暑でドライスポットの発生が起こりやすく、水管理が重要です。又ベントは呼吸量も上がり糖の消費も大きいシーズンです。糖、アミノ酸はメンテナンスの上で有効な資材です。

**ドライスポット** ... 予防 **プライマ 604** 2 ml/m<sup>2</sup>  
発生後 **アクアダクト** 2.5ml/m<sup>2</sup> } 水 1L/m<sup>2</sup>  
ドライの撥水層が8~10cmの場合は、7~10日後に追加処理が必要です。

**病 気** **ダラスポット** ... **ロブドー** 2g/m<sup>2</sup> 水 0.5~1L

**害 虫**  
**コガネ幼虫** ... **ダイアジノンSLゾル** 250倍液 水 1L/m<sup>2</sup>  
**タマナヤガ** ... **ダイボスチオン** 1,000倍 水 0.5~1L/m<sup>2</sup>  
**シバツトガ** ... **エキソジノン** 1,000倍 水 0.3~1L/m<sup>2</sup>

**栄養剤**  
**糖の補給** **グリーンメカ・メカプラス** 5ml/m<sup>2</sup>  
**アミノ酸補給** **マリンパワー** 1~2ml/m<sup>2</sup>  
**病気、踏圧によるダメージの回復** **メカエース** 5ml/m<sup>2</sup> 2回処理はより有効です。

## コーライ

**フェアリーリング** **ロブドー + (AGL, アクアダクト) 加用** } 水 1L/m<sup>2</sup>  
**葉枯病(犬の足跡)** **ロブドー** 2g/m<sup>2</sup>

8月ベント同様 水管理とアミノ酸補給が必要です。

9月暑さ寒さも彼岸までと云われておりますがコーライも生育が低下し、蓄積養分(デンプン)を貯蔵する時期です。又、サビ病、犬の足跡は早めの防除が必要です。

**病 気** **葉枯病(犬の足跡)** ... 予防剤 **グリンオキシラン** 2g/m<sup>2</sup>  
予防、治療 **ロブドー** 2g/m<sup>2</sup> } 水 0.5~1L/m<sup>2</sup>

**害 虫**  
**シバツトガ** **エキソジノン** 1,000倍 水 0.3~1L/m<sup>2</sup>  
**コガネ幼虫** ... **ダイアジノンSLゾル** 250倍 水 1L

**栄養剤** **グリーンメカ** **メカエース** 5ml/m<sup>2</sup> 水 1L

**除草剤** **スズメノカタビラ防除** ... **ジェイサン(SAP)** 2~3ml/m<sup>2</sup> **泡消し** SAP剤のしつこい泡も消す BBS

## ティーオーバーシード

**ベレニアルライグラス** ... **VIP**, **ラレド**, **フローラ** **臭い消し** SAP剤の臭いノズルマン喜ぶレスメルくん

**ケンタッキーブルーグラス** ... **ビバ**, **ノウム**

**トールフェスキュ** ... **ボンサイ**, **トワイライト**

## 池の防藻剤

**ワラープルー** ... 水100tに1袋(22g)

**ニチトップKT** ... 水100tに200ml 2ppmでご使用下さい

**除草剤用マーカー** カラーマーカー

## マメ知識

### シバツトガ (鱗翅目)

産卵数 平均150コ  
フ化期間(産卵 幼虫) 30 5日 25 7日  
幼虫期間 37日

### 成虫の活動

夜行性で日中は日陰のできる樹林の葉裏などで生息する。標高が高くなるとコース内の小木などにも生息する。夜、雪が降るように飛翅が見られるのは、被害を及ぼす前兆の1つで要注意。



# プライマ-604

日本導入7周年キャンペーン

好評 実施中 切り迫る!!

8月末まで

申込期限: 9月10日(月)

(以後無効となりますので、ご注意ください)

