培養土専用界面活性剤

コンダクターは培養土の撥水（水はじき）を防ぎます

Aquatrols® conductor®

コンダクター

- ピートモス等を使用した 軽量培養土 の必需品です!!
- 従来品に比べ、保管時の 長期残効 があります!!
- 透・排水性 を改善し、培養土全体に水が行き渡ります!!
- 少ない使用量 で効果があります!!
- 水分率が下がっても 再湿潤 します!!

長期残効試験

保管した培養土をポットに詰めて注水したときの保水量



コンダクターは保管培養土を湿潤させました



※培養土の種類や保管状況により異なります

		コンダクターL（液状タイプ）	コンダクターG（粒状タイプ）
成分		界面活性剤	界面活性剤＋バーミキュライト
性状		粘性のある透明液体	粉粒状(バーミキュライトの細粒)
使用方法	対象培養土	ピートモス等の有機物を使用した培養土	
	標準使用量（培養土1㎥あたり）	100～200 ml	250～500 g
		培養土を弊社までお送りいただければ、最適な使用量をご提案いたします。	
	処理方法	培養土 1m³当たり 10～20ℓの水に溶かして、培養土にスプレーしながら混合攪拌してください。 ※水量は完成時の含水率に合わせて調節してください。	培養土全体にまんべんなく混ざるように撹拌しながら混合してください。 ミキサーを使用しない場合は等量の培養土と本剤を良く混ぜ、更に等量の培養土と混ぜると均一に撹拌できます。
包装		10ℓ	20kg

栽培期間中の培養土の撥水防止には、サイマトリック液剤 または サイマトEZ をご使用ください。

使用上の注意

- 必ず標準使用量を守ってお使いください。使用前に試験することをおすすめします。
- 直射日光を避けて、冷暗所に保管してください。
- 小児の手の届くところや、飲食物と同じ場所に置かないでください。

保管上の注意

- 目的外の使用はしないでください。
- 希釈液は速やかに使用してください。
- 液肥と混合する時は、本剤を完全に水に溶かしてから、次に液肥を加えて撹拌してください。
  初めて混合する時は、少量を混合して物性の変化がないことを確認してからご使用ください。
- 目に対して刺激性があるので、目に入らないよう注意してください。
  目に入った場合は直ちに水洗いしてください。
- 皮膚に付着した場合は石けんでよく洗ってください。

芝用・農園芸用薬剤の開発と輸出入

株式会社 トモグリーン・ケミカル

〒420-0816　静岡市葵区沓谷 5 丁目 9-12
TEL 054-264-2151　FAX 054-264-2153
http://www.tomo-green.com

FJCE